

BERGIN® Lytopect

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Ferkel, Schaf- und Ziegenlämmer zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

Art. Nr. 0482

GMP+-anerkannt



Inhaltsstoffe:

4,0 % Rohprotein	1,5 % Rohfaser	1,5 % Kalium
0,3 % Lysin	18,5 % Rohasche	4,0 % Natrium
0,1 % Methionin	65,0 % Gesamtzucker	6,2 % Chlorid
1,0 % Rohfett		

Zusammensetzung:

Traubenzucker, Natriumchlorid, Molkepulver, teilentz. u. teilentmin., Molkepulver, Flohsamenschalen (Psyllium), Hefe extrahiert

Zusatzstoffe je kg:

ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

125.000 IE Vitamin A, 3a672a, 10.000 IE Vitamin D₃, E671, 2.000 mg Vitamin E, 3a700, 2.000 mg Vitamin C, 3a300, 10 mg Vitamin K₃, 3a710, 45 mg Vitamin B₁, 3a821, 25 mg Vitamin B₂, 30 mg Vitamin B₆/Pyridoxinhydrochlorid, 3a831, 150 mcg Vitamin B₁₂, 60 mg Calcium-D-Pantothenat, 3a841, 120 mg Niacinamid, 3a315, 12 mg Folsäure, 3a316, 950 mcg Biotin, 3a880, 75 mg Beta-Carotin, 3a160(a), 7.000 mg Betain (Betainhydrochlorid), 3a925, 300 mg Eisen, E1, Glycin-Eisenchelat, Hydrat, 10 mg Kupfer, E4, Glycin-Kupferchelat, Hydrat, 60 mg Zink, E6 Glycin-Zinkchelate, Hydrat, 40 mg Mangan, E5, Glycin-Manganchelate, Hydrat, 0,3 mg Kobalt, 3b301, Kobalt-(II)-acetat, Tetrahydrat, 0,2 mg Jod, (Calciumjodat, wasserfrei), 3b202, 0,2 mg Selen (Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), 3b8.10

zootechnische Zusatzstoffe:

$\times 10^8$ KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181), 4b1708

technologische Zusatzstoffe:

Kaliumcitrat, E332, Kaliumsorbat, E202

Fütterungshinweis:

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen 1 bis 3 mal täglich Diättränke verabreichen.

Dosierung:

50 g BERGIN® Lytopect pro Liter Wasser auflösen.

Nettomasse: 4 kg

Einsatzdauer:

1 bis 7 Tage als Zwischenmahlzeit.

„Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.“

Bezugsnummer der Partie:

siehe Aufkleber

Mindesthaltbarkeitsdatum:

Diät-Ergänzungsfuttermittel einschl. Zusatzstoffe mind. haltbar bis: siehe Aufkleber
Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung (hygienisch, kühl, trocken) voraus. Keine Haftung bei falscher Behandlung und Lagerung.

Fütterungsempfehlung für Kälber:

1. Bei schweren Durchfällen

Tagesmilchmenge auf 3 Mahlzeiten verteilen. 1 bis 3 Tage lang jeweils 2 Stunden nach der Milchtränke Zwischenmahlzeit mit 2 l BERGIN® Lytopect-Diättränke verabreichen.
Nach Abklingen des Durchfalls für weitere 3 bis 5 Tage mittags 2 l BERGIN® Lytopect-Diättränke anbieten.

2. Bei leichten Durchfällen oder geschwächten Kälbern

Für 1 bis 7 Tage mittags eine Zwischenmahlzeit mit 2 l BERGIN® Lytopect-Diättränke geben.

3. Bei Zukaufskälbern

3 bis 5 Tage 2 l BERGIN® Lytopect-Diättränke als Zwischenmahlzeit anbieten.

Fütterungsempfehlung für Ferkel:

1. Bei Saugferkeldurchfällen

BERGIN® Lytopect-Diättränke zur freien Aufnahme als Wasserersatz anbieten

2. Zur Vorbeuge und bei Verdauungsstörungen im Absatzbereich:

BERGIN® Lytopect-Diättränke in den ersten 5 bis 7 Tagen nach dem Absetzen zur freien Aufnahme anbieten.

Fütterungsempfehlung für Schaf- und Ziegenlämmer:

Tagesmilchmenge auf möglichst viele Mahlzeiten verteilen. Zwischenmahlzeiten mit BERGIN® Lytopect-Diättränke geben.

Flüssigkeitsbedarf liegt bei ca. 12 % der Lebendmasse.

Der Abstand von Milchgabe und Diättränkeaufnahme sollte etwa 2 Stunden sein.

Dosierhinweis: 1 Stielmessbecher = 50 g

Hinweis: Der Flüssigkeitsbedarf beträgt normalerweise 12 % des Lebendgewichtes.

Bei Durchfällen kann der Flüssigkeitsbedarf bis auf 20 % des Lebendgewichtes ansteigen. Ungenügende Flüssigkeitszufuhr führt zu lebensbedrohlichem Austrocknen.



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Str. 13, D-95326 Kulmbach, Tel. +49 9221 806-0
Anerk.-Nr. α DE-BY-1-00036
QS-zertifiziert: QS-ID 4031735000450
„pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich“

24
160601